

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合感冒剤	60歳代	女	肝障害	9錠中、アセトアミノフェン 900mg、ヨウ化イソプロパミド 6mg、d-マレイン酸クロルフェニラミン 3.5mg、トラネキサム酸 420mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg、無水カフェイン 75mg、ヘスペリジン(ビタミンPの一種) 不明	内用薬	軽快
総合感冒剤	40歳代	女	アナフィラキシー反応	2カプセル中イソプロピルアンチピリン150mg、アセトアミノフェン225mg、マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg、リン酸ジヒドロコデイン6mg、dl-塩酸メチルエフェドリン30mg、カンゾウエキス末59mg(カンゾウ491.5mg)、無水カフェイン13mL中 酢酸d- α -トコフェロール 0.05% ピリドキシン塩酸塩 0.05% パンテノール 0.05% ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005% クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.01% イプシロン-アミノカプロン酸 1% アミノエチルスルホン酸(タウリン) 1%	内用薬	回復
総合感冒剤	20歳代	男	アナフィラキシー反応・蕁麻疹	13mL中 プラノプロフェン0.5mg	外用薬	回復
眼科用剤	70歳代	女	閉塞隅角緑内障	<2カプセル中> 塩酸プソイドエフェドリン・・・60mg、マレイン酸カルビノキサミン・・・6mg、ベラドンナ総アルカロイド・・・0.2mg、塩化リゾチーム・・・15mg(力価)、無水カフェイン・・・50mg	外用薬	回復
眼科用剤	30歳代	女	視力低下	4カプセル中 塩酸プソイドエフェドリン 120mg 塩化リゾチーム 60mg(力価) マレイン酸クロルフェニラミン 8mg ベラドンナ総アルカロイド 0.4mg 無水カフェイン 100mg	内用薬	回復
耳鼻科用剤	20歳代	男	頭痛・嘔吐	100mL中 ケトチフェンフマル酸塩 75.6mg	内用薬	回復
耳鼻科用剤	10歳代	女	意識変容状態	1カプセル中 ケトチフェンフマル酸塩 1.38mg (ケトチフェン 1mg)	外用薬	不明
耳鼻科用剤	30歳代	女	蕁麻疹	1カプセル中 ケトチフェンフマル酸塩 1.38mg (ケトチフェン 1mg)	内用薬	不明
耳鼻科用剤	40歳代	女	傾眠	3包中塩化リゾチーム90mg(力価)、塩酸フェニレフリン10mg、ベラドンナ総アルカロイド0.4mg、マレイン酸クロルフェニラミン12mg	内用薬	不明
耳鼻科用剤	60歳代	男	呼吸異常	<2カプセル中> 塩酸プソイドエフェドリン・・・60mg、マレイン酸カルビノキサミン・・・6mg、ベラドンナ総アルカロイド・・・0.2mg、塩化リゾチーム・・・15mg(力価)、無水カフェイン・・・50mg	内用薬	回復
耳鼻科用剤	10歳代	男	意識変容状態	3カプセル中、メキタジン 4.0mg、ベラドンナ総アルカロイド 0.4mg、無水カフェイン 150.0mg、塩化リゾチーム 90.0mg、グリチルリチン酸二カリウム 46.2mg	内用薬	回復
耳鼻科用剤	40歳代	男	スティーブンス・ジョンソン症候群	1日量(6錠中) d-マレイン酸クロルフェニラミン・・・6mg、ベラドンナ総アルカロイド・・・0.4mg、塩酸プソイドエフェドリン・・・180mg、塩化リゾチーム・・・75mg、無水カフェイン・・・	内用薬	回復
耳鼻科用剤	10歳未満	男	呼吸困難	3カプセル中d-マレイン酸クロルフェニラミン6mg、塩酸プソイドエフェドリン120mg、ベラドンナ酸アルカロイド0.6mg、無水カフェイン120mg	内用薬	回復
耳鼻科用剤	40歳代	男	意識変容状態		内用薬	回復
耳鼻科用剤	40歳代	女	剥脱性皮膚炎		内用薬	軽快

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
鎮暈剤	60歳代	女	多形紅斑	2錠中塩酸メクリジン25mg, 臭化水素酸スコポラミン0.25	内用薬	回復
鎮暈剤	10歳代	男	痙攣	2錠中塩酸メクリジン25mg, 臭化水素酸スコポラミン0.25	内用薬	回復
鎮咳剤	40歳代	女	肝炎	4包(4.8g)中マオウエキス1.635g, カンゾウエキス844mg, ショウキョウエキス188mg, ケイヒエキス62mg, サイシンエキス361mg, ゴシエエキス621mg, ハンゲエキス198mg, マレイン酸クロルフェニラミン8.2mg, 無水カフェイン120mg, ノスカピン48mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240	内用薬	軽快
鎮咳剤	30歳代	女	薬疹	2カプセルヨウ化イソプロパミド5mg マレイン酸クロルフェニラミン8mg プロメライン80000U	内用薬	回復
鎮咳去たん剤	30歳代	男	痙攣・代謝性アシドーシス	12錠中リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン50mg, マレイン酸クロルフェニラミン8mg, 無水カフェイン60mg	内用薬	回復
鎮咳去たん剤	10歳未満	男	アナフィラキシー反応	60mL中リン酸コデイン50mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン60mg, セネガ流エキス1.5g	内用薬	回復
鎮咳去たん剤	80歳代	女	脱水・尿路感染	60mL中リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, グアヤコールスルホン酸カリウム270mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン60mg, キキョウエキス240mg(キキョウ960mg), バクモンドウ流エキス1.25mL(バクモンドウ1.25g)	内用薬	軽快
鎮咳去たん剤	不明	女	紅斑	60mL中リン酸コデイン50mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン60mg, セネガ流エキス1.5g	内用薬	軽快
鎮咳去たん剤	60歳代	女	アナフィラキシー反応	30mL中臭化水素酸デキストロトルファン60mg, グアイフェネシン170mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン62mg	内用薬	回復
鎮咳去たん剤	10歳代	女	スティーブンス・ジョンソン症候群	12錠中リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン50mg, マレイン酸クロルフェニラミン8mg, 無水カフェイン40mg	内用薬	回復(後)
健胃消化剤	50歳代	男	アナフィラキシー様反応	4包(12g)中ガジュツ末10000mg、真昆布末400mg	内用薬	回復
健胃消化剤	50歳代	男	肝機能異常	3包(3g)中テプレノン112.5mg, ソウジュツ乾燥エキス150mg(ソウジュツ1.5g), コウボク乾燥エキス83.4mg(コウボク1.5g)	内用薬	軽快
健胃消化剤	50歳代	男	肝機能異常	1包(3g)中ガジュツ末2.5g, 真昆布末0.1g, ウコン末33mg, ショウキョウ末16mg, 結晶セルロース351mg	内用薬	回復
健胃消化剤	50歳代	男	急性肝炎	6錠中 トリメプチンマレイン酸塩(MT)300mg、ピオチアスターゼ2000120mg、リパーゼAP645mg、カンゾウ末150mg、ロートエキス30mg、炭酸水素ナトリウム300mg、沈降炭酸カルシウム600mg、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム(乾燥)	内用薬	軽快
健胃消化剤	60歳代	男	アナフィラキシー様反応	1包(3g)中ガジュツ末2.5g, 真昆布末0.1g, ウコン末33mg, ショウキョウ末16mg, 結晶セルロース351mg	内用薬	不明
健胃消化剤	50歳代	男	肝障害	1包(3g)中ガジュツ末2.5g, 真昆布末0.1g, ウコン末33mg, ショウキョウ末16mg, 結晶セルロース351mg	内用薬	不明
制酸剤	60歳代	女	肝障害・中毒性表皮壊死融解症	1錠中ファモチジン10mg	内用薬	死亡

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
制酸剤	60歳代	女	肝機能異常	1包(0.5g中)ファモチジン10mg	内用薬	軽快
下剤, 浣腸剤	70歳代	男	直腸穿孔	60mL中 日局グリセリン30g	外用薬	軽快
下剤, 浣腸剤	60歳代	男	直腸穿孔	60mL中 日局グリセリン30g	外用薬	軽快
下剤, 浣腸剤	70歳代	女	腹痛	1錠中ピサコジル5mg	内用薬	軽快
下剤, 浣腸剤	80歳代	女	ショック	1個中炭酸水素ナトリウム0.5g, 無水リン酸二水素ナトリウム0.68g	外用薬	回復
複合胃腸剤	不明	女	黄疸	3包(4.5g)中 トリメブチンマレイン酸塩(MT) 300mg、ピオチアスターゼ2000 120mg、リパーゼAP6 45mg、カンゾウ末 150mg、ロートエキス 30mg、炭酸水素ナトリウム 300mg、沈降炭酸カルシウム 600mg、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム(乾燥物換算) 240mg	内用薬	未回復
複合胃腸剤	60歳代	女	意識消失	3包(4.5g)中 トリメブチンマレイン酸塩(MT) 300mg、ピオチアスターゼ2000 120mg、リパーゼAP6 45mg、カンゾウ末 150mg、ロートエキス 30mg、炭酸水素ナトリウム 300mg、沈降炭酸カルシウム 600mg、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム(乾燥物換算) 240mg	内用薬	回復
複合胃腸剤	60歳代	女	腹痛・嘔吐・下痢	3個中オウレンエキス28mg, オウバクエキス152mg, センブリエキス28mg, ゲンチアナエキス80mg, ダイオウエキス80mg, ウコンエキス140mg, アロエ150mg, 動物胆50mg, アカメガシワエキス400mg	内用薬	軽快
複合胃腸剤	20歳代	女	蕁麻疹・肝機能異常	成分 3包(1日量)中 ケイヒ末 480mg ウイキョウ末 360mg ニンジン末 300mg ショウキョウ末 180mg カンゾウ末 150mg アルジオキサ 180mg アカメガシワ 90mg	内用薬	未回復
泌尿器用剤	50歳代	女	急性肝炎	3包(6g)中、ウワウルシ乾燥エキス1.25g(ウワウルシ10gに	内用薬	軽快
その他の泌尿生殖器 及び肛門用薬	70歳代	女	横紋筋融解	2瓶(60mL)中生薬エキスH 11mL(ジオウ5g, ブクリョウ・タクシャ・サンシュユ・ボタンピ・サンヤク各3g, ケイヒ・ホウブ	内用薬	回復
外皮用殺菌消毒剤	40歳代	女	接触性皮膚炎	75mL中塩酸ジブカイン75mg, 塩酸ナファゾリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン150mg, 塩化ベンゼトニウム75m	外用薬	回復
外皮用殺菌消毒剤	40歳代	女	接触性皮膚炎	75mL中塩酸ジブカイン75mg, 塩酸ナファゾリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン150mg, 塩化ベンゼトニウム75m	外用薬	軽快
化膿性疾患用剤	20歳代	女	接触性皮膚炎	100g中ウコン末2.86g, オウバク末1.43g, スルフィソキサゾール5g, 塩酸ジフェンヒドラミン0.71g	外用薬	軽快
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎 剤	20歳代	女	接触性皮膚炎・剥脱性皮膚炎	1g中ブフェキサマク50mg, ジフェニルイミダゾール2mg, 酢酸トコフェロール5mg	外用薬	軽快
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎 剤	30歳代	女	接触性皮膚炎	1g中酢酸デキサメタゾン0.25mg, クロタミトン50mg, 塩酸ジブカイン3mg, 塩酸ジフェンヒドラミン10mg, dl-カンフル30mg, l-メントール35mg	外用薬	回復
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎 剤	50歳代	女	アナフィラキシーショック	膏体100g中、サリチル酸グリコール 1.25g、l-メントール 1.00g、酢酸トコフェロール 1.00g、グリチルレチン酸 0.05g	外用薬	回復

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎	20歳代	女	接触性皮膚炎	100g中ブフェキサマク1g, グリチルレチン酸0.2g	外用薬	軽快
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎 剤	60歳代	女	接触性皮膚炎	100g中サリチル酸グリコール4.3g, l-メントール6.1g, 酢酸トコフェロール4.3g, ノニル酸ワニリリアミド12mg(1枚72×55mm ²). 伸縮性)	外用薬	軽快
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎 剤	70歳代	男	発疹・疼痛	100g(1,400cm ²)中アルニカチンキ1mL(アルニカ0.2g), セイヨウトチノキ種子エキス0.1g(セイヨウトチノキ0.6g), サリチル酸グリコール1g, l-メントール0.3g(伸縮性)	外用薬	軽快
寄生性皮膚疾患用剤	80歳代	男	吐血	<1g中> 塩酸テルビナフィン・10mg	外用薬	回復
毛髪用剤(発毛剤, 脱毛 剤, 染毛剤, 養毛剤)	60歳代	男	リンパ腫	100ml中、ミノキシジル1.0g	外用薬	不明
その他の歯科口腔用薬	60歳代	男	アナフィラキシーショック	不明	外用薬	軽快
その他の歯科口腔用薬	60歳代	男	アナフィラキシー反応	100ml中、ヨウ素0.5g	内用薬	回復
ビタミンA及びD剤	80歳代	女	突発難聴	2カプセル中 コレカルシフェロール 0.01mg(ビタミンDとして400I.U.)	内用薬	回復
ビタミンB1剤	50歳代	女	肝機能異常	9錠中 塩酸フルスルチアミン 109.16mg 酪酸リボフラビン 12mg 塩酸ピリドキシン 30mg シアノコバラミン60μg コンドロイチン硫酸ナトリウム 900mg	内用薬	回復
ビタミンB2剤	30歳代	女	スティーブンス・ジョンソン症候群	3錠中ベンフォチアミン138.3mg(塩酸チアミン100mg), オキソアミチン末50mg, ガンマ-オリザノール10mg, リボフラビン12mg, 塩酸ピリドキシン50mg, シアノコバラミン60μg, コハク酸トコフェロールカルシウム103.58mg(コハク酸dl-α-トコフェロール100mg)	内用薬	回復
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	60歳代	女	上腹部痛・呼吸困難・蒼白	2錠中 塩酸ジセチアミン 120mg リボフラビン 10mg 塩酸ピリドキシン 50mg シアノコバラミン 60μg コハク酸d-α-トコフェロール 100mg	内用薬	回復
カルシウム剤	80歳代	女	便秘	2錠中沈降炭酸カルシウム1.525g(カルシウム610mg), 炭酸マグネシウム118.4mg(マグネシウム30mg), コレカルシフェロール400I.U.	内用薬	回復
その他の滋養強壮薬	30歳代	女	肝障害	15錠中カシュウ3.6g	内用薬	軽快
その他の滋養強壮薬	40歳代	男	肝炎	1丸(4.8g)中ゴオウ・カンゾウ・ニンジン各300mg, レイヨウカク270mg, シャクヤク240mg, アキョウ210mg, ケイヒ・ポウフウ・センキュウ・トウキ各180mg, リュウノウ57.5mg	内用薬	軽快
その他の滋養強壮薬	30歳代	女	急性肝炎	15錠中カシュウ3.6g	内用薬	回復
総合代謝性製剤	70歳代	男	中毒性皮疹	500mL中リバーコンセントレイト(肝臓エキス)12.5g, 塩化カルニチン2.5g, ニンジンエキス2.5g, アミノエチルスルホン酸25g, 塩酸チアミン0.5g, リン酸リボフラビンナトリウム0.3g, ニコチン酸アミド2.5g, シアノコバラミン250μg	内用薬	軽快

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合代謝性製剤	50歳代	女	肝障害	8錠中乾燥エキス500mg(エンゴサク0.91g, カノコソウ・シャクヤク・トウキ各0.61g, ケイヒ0.43g, センキュウ・ポタンピ各0.3g, ブクリヨウ0.24g, ソウジュツ0.18g, ジオウ・チンピ各0.15g, カンゾウ・コウブシ・トウニン各0.12g, オウレン0.06g, ショウキョウ・チョウジ・ニンジン各0.03g), センナエキス25mg, コハク酸トコフェロールカルシウム10mg, ニコチン酸アミド10mg, パントテン酸カルシウム10mg, 葉酸5mg, 硝酸チアミン5mg, 塩酸ピリドキシン1mg, リボフ	内用薬	回復
総合代謝性製剤	60歳代	女	出血性胃潰瘍	2錠中 エソウコギ乾燥エキス(原生薬換算量300mg)12.0mg オウギ乾燥エキス(原生薬換算量240mg)30.0mg オキソアミチン末 50.0mg 塩酸アルギニン 50.0mg 硝酸チアミン(V.B1) 10.0mg リボフラビン(V.B2) 4.0mg 塩酸ピリドキシン(V.B6) 10.0mg コハク酸トコフェロールカルシウム(コハク酸dl- α -トコフェロール(V.E)として20.0mg) 20.7mg L-アスコルビン酸ナトリウム(アスコルビン酸(V.C)として100.0mg) 112	内用薬	軽快
他に分類されない代謝性医薬品	60歳代	女	肝機能異常	1錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム260mg	内用薬	回復
他に分類されない代謝性医薬品	50歳代	女	肝障害	1錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム260mg	内用薬	軽快
抗ヒスタミン剤	50歳代	男	アナフィラキシーショック	1錠中マレイン酸クロルフェニラミン1.5mg, 塩酸ピリドキシン2.5mg, グリチルリチン酸カリウム20mg, グルコン酸カルシウム150mg	内用薬	回復
抗ヒスタミン剤	30歳代	女	薬物毒性	9錠中塩酸ジフェンヒドラミン90mg, グリチルリチン酸ニカリウム90mg, リボフラビン6mg, 塩酸ピリドキシン15mg, オロチン酸90mg	内用薬	未回復
抗ヒスタミン剤	30歳代	女	薬物毒性	1錠中塩酸ジフェンヒドラミン10mg	内用薬	未回復
その他のアレルギー用薬	20歳代	女	傾眠・倦怠感・浮動性めまい	1カプセル中、フマル酸ケトチフェン 1.38mg	内用薬	不明
生薬	70歳代	女	肝障害	4カプセル中ロクジョウ・カイバトチュウ・アキョウ各67mg, コウクジン・ケイヒ各53mg, トウキ・ニンジン各133mg, コクロジン235mg, ポタンピ33mg, 水性エキス818mg(センボウ・トシシ・ホコツシ・コロハ・ハゲキテン・ニクジュヨウ・サヨウ・フクボンシ・ホウブシ・ゲンジン・ビャクジュツ・サンシュユ・バクモンドウ各67mg, インヨウカク・ジュクジオウ・クコシ・オウギ・ブクリヨウ各133mg, センゾクダン・ゴシツ・カンゾウ各33m	内用薬	回復
生薬	不明	男	肝機能異常	4カプセル中ロクジョウ・カイバトチュウ・アキョウ各67mg, コウクジン・ケイヒ各53mg, トウキ・ニンジン各133mg, コクロジン235mg, ポタンピ33mg, 水性エキス818mg(センボウ・トシシ・ホコツシ・コロハ・ハゲキテン・ニクジュヨウ・サヨウ・フクボンシ・ホウブシ・ゲンジン・ビャクジュツ・サンシュユ・バクモンドウ各67mg, インヨウカク・ジュクジオウ・クコシ・オウギ・ブクリヨウ各133mg, センゾクダン・ゴシツ・カンゾウ各33m	内用薬	回復

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
漢方製剤	80歳代	女	間質性肺疾患	2包(4.5g)中乾燥エキス2.5g(ハンゲ3g, カンゾウ・ケイヒ・ゴミシ・サイシン・シャクヤク・マオウ・カンキョウ各1.5g)	内用薬	死亡
漢方製剤	60歳代	男	黄疸・肝機能異常	3本(90ml)中、小青竜湯軟エキス10.25g(日局マオウ3.0g、日局シャクヤク3.0g、カンキョウ3.0g、日局カンゾウ3.0g、日局ケイヒ3.0g、日局サイシン3.0g、日局ゴミシ3.0g、日局ハンゲ6.0gより得た軟エキス)	内用薬	軽快
漢方製剤	60歳代	女	肝機能異常	15錠中水製エキス2.8g(ブクリョウ3g, カンゾウ・ジオウ・カッセキ・トウキ・タクシャ・シャゼンシ・オウゴン・モクツウ各1.5g, シャクヤク・サンシ各1g)	内用薬	軽快
漢方製剤	30歳代	女	肝機能異常	9錠中、防風通聖散料乾燥エキス3.0g(キキョウ1.2g、ビャクジュツ1.2g、カンゾウ1.2g、オウゴン1.2g、セッコウ1.2g、ダイオウ0.9g、トウキ0.72g、シャクヤク0.72g、センキュウ0.72g、サンシ0.72g、レンギョウ0.72g、ハッカ0.72g、ケイガイ0.72g、ポウフウ0.72g、マオウ0.72g、ショウキョウ0.24g、カッセキ1.8g、ポウ	内用薬	回復
漢方製剤	70歳代	女	間質性肺疾患	下記生薬より得た防風通聖散エキス粉末2,750mgを含む トウキ 0.6g シャクヤク 0.6g センキュウ 0.6g サンシ 0.6g レンギョウ 0.6g ハッカ 0.6g ショウキョウ 0.2g ケイガイ 0.6g ポウフウ 0.6g マオウ 0.6g ダイオウ 0.75g 乾燥硫酸ナトリウム 0.375g ビャクジュツ 1.0g キキョウ 1.0g オウゴン 1.0g カンゾウ 1.0g セッコウ 1.0g カッセキ 1.5g	内用薬	回復
漢方製剤	20歳代	男	肝機能異常	12錠中 ポウフウ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g	内用薬	回復
漢方製剤	不明	女	肝機能異常	12錠中 ポウフウ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g	内用薬	不明
漢方製剤	50歳代	男	肝機能異常	12錠中 ポウフウ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g	内用薬	回復
漢方製剤	40歳代	男	肝機能異常	12錠中 ポウフウ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g	内用薬	軽快
漢方製剤	70歳代	男	間質性肺疾患	12錠中 ポウフウ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g	内用薬	軽快