野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスク評価
(実施機関：北海道大学・鳥取大学)

渡り鳥に存在するH5, H7亜型ウイルスのリスク評価 (北海道大学)

海外および国内の最初の飛来地における鳥インフルエンザのサーベイランスの強化

H5亜型

H7亜型

- ・ 分離ウイルスの各動物に対する
 - 致死率
 - ウイルス排泄量
 - 潜伏期間etc.
- ・ 分離ウイルスに対する現行診断技術の有効性検討

ウイルスの家禽へのリスク評価

モンゴル・北海道における鳥インフルエンザ（2011）

Mongolia (28 isolates /893)

H3N8 (19) H3N6 (1) H4N3 (1) H4N6 (1)
 H4N8 (1) H5N3 (2) H8N4 (2) H10N7 (1)

Hokkaido (7 isolates /458)

H3N8 (1) H4N6 (4)
H7N7 (2)

サンプル総数 : 5,828

鳥インフルエンザウイルス陽性 : 35

*分離されたH5およびH7ウイルスは、遺伝子解析の結果、低病原性株と判明

2010-2011冬季に日本で分離されたH5N1ウイルスの接種試験成績

済み

ニワトリ

- ・ 感染する
- ・ 全身増殖
- ・ **致命的**

アヒル

- ・ 感染する
- ・ 全身増殖
- ・ 臨床症状なし

マウス (実験動物)

- ・ 感染する
- ・ 全身増殖
- ・ **致命的**

カラス (野生)

- ・ 感染する
- ・ 一部の臓器で増殖
- ・ 臨床症状なし

計画中

スズメ (野生)

?

クマネズミ (野生)

?

* 当初の計画通り進行中