

SARSの感染サイクル(未解明)

動物由来と推定


宿主動物:不明

ヒトへの媒介動物:不明



ハクビシン

?



SARSコロナウイルス



人 → 人

ベッドサイドで飛沫等から
糞口感染(下痢)から

患者発生国 : 29ヶ国 患者8096名 死亡者774名

主な発生国 : 中国、香港、台湾、シンガポール、カナダ、ベトナム。(日本は奇跡的に発生無し)

実験室内感染の発生: 2003年シンガポール、台湾、2004年中国 未熟な科学技術と微生物管理不十分

トリインフルエンザのアジアでの続発

平成15年12月以降の高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)発生国及びヒトでの発症事例
(WHO・各国政府の正式な公表に基づく)



- : トリにおけるH5N1の発生国
- : ↑のうち5月以降も発生している国
- : ↑のうちヒトへの感染も認められた国

注) 上図の他、ヒトへの感染事例として、
1997年香港(H5N1 18名感染、6人死亡)
2003年香港(H5N1 2名感染、1人死亡)
2003年オランダ(H7N7 89名感染、1人死亡)
2004年カナダ(H7N3 2名感染、死亡なし)がある。

作成: 厚生労働省健康局結核感染症課

鳥インフルエンザと新型インフルエンザの関係

