⑤ 開発の効率化による経費の削減

経済性の高いルート選定の実現 ⇒ 開発コストの軽減に貢献

森林分布, 永久凍土, 地形・地質などにより, 比較ルート
を評価, 最適条件ルートを選定。自然環境の厳しい
遠隔地域において, 衛星データは重要な情報源を提供。

予察的パイプライン計画とGISによる評価図
 青:コスト低い >> 赤:コスト高い

2. 金属資源探査・開発

(1) 金属鉱床の指標として変質帯を探す

金・銀・銅などの非鉄金属はスペクトル特徴を示さない
 ⇒変質帯を抽出し鉱床探査の指標とする

[チリ・エスコンディージャ銅鉱山の事例]

斑岩銅鉱床は火山活動と同時にマagmaから上昇する熱水による変質に伴い形成される。火山は数百万年間に浸食を受け、その中心部が地表近くに現れ、リモートセンシング探査の対象となる。

宇宙から変質帯を探す

①短波長赤外データを利用

緑=絹雲母+モンモリロン石(中性)
 赤=明礬石+カオリナイト+石膏(酸性)
 青=緑泥石+方解石(アルカリ性)

- ②既存鉱山に適用
既存鉱山で手法の検証
- OK?
- ③未探査地域に応用
変質帯分布抽出と評価
(未発見の鉱床有望地を抽出)
- ④鉱区取得
- ⑤ 探査・開発へ

(2) 金属資源開発に伴う環境影響モニタリング

探鉱及び開発以降の環境管理が、鉱区取得・開発の重要条件に。

鉱物のスペクトル特徴を利用した土壌汚染モニタ

Figure 4. Spectral traverse and AVIRIS mineral maps overlaid on a high-spatial-resolution aerial photograph

生産終了後も含めた環境管理が
鉱区取得の重要条件項目に

ハイパースペクトルデータを用いた
鉱物マッピングの手法を応用し、酸
性水により生成される2次的な鉱物
を検知して鉱山の採掘に伴う土壌
汚染を把握

日本の宇宙技術で環境の管理をすることによる
国際的信用性の向上→鉱区取得、探鉱環境
の向上

出典: 鉱山における土壌汚染調査 (Swayze et al., 2000)