

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
漢方製剤	30歳代	女	肝障害	3包(9g)中麦門冬湯エキス末5.625g(バクモンドウ6g, ハンゲ3.75g, コウベイ7.5g, タイソウ2.25g, ニンジン・カンゾウ各1.5g)	内用薬	不明
漢方製剤	50歳代	男	肝障害	2包(3.75g)中乾燥エキス2.25g(ハンゲ2.5g, オウゴン・カンゾウ・タイソウ・ニンジン・カンキョウ各1.25g, オウレン	内用薬	軽快
漢方製剤	50歳代	男	肝障害	9錠中、防風通聖散料乾燥エキス3.0g(キキョウ1.2g, ビャクジュツ1.2g, カンゾウ1.2g, オウゴン1.2g, セッコウ1.2g, ダイオウ0.9g, トウキ0.72g, シャクヤク0.72g, センキュウ0.72g, サンシシ0.72g, レンギョウ0.72g, ハッカ0.72g, ケイガイ0.72g, ポウフウ0.72g, マオウ0.72g, ショウキョウ0.24g, カッセキ1.8g, ポウ	内用薬	回復
漢方製剤	50歳代	女	肝機能異常	12錠中 ポウフウ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g	内用薬	軽快
漢方製剤	30歳代	男	肝機能異常	12錠中 ポウフウ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g	内用薬	軽快
漢方製剤	70歳代	男	呼吸困難	3包(6g)中小青竜湯エキス末5.2g(マオウ・シャクヤク・カンキョウ・カンゾウ・ケイヒ・サイシン・ゴミシ各3g, ハンゲ6g)	内用薬	回復
漢方製剤	30歳代	女	流産	12錠中 ポウフウ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g	内用薬	不明
漢方製剤	成人	男	間質性肺疾患	12錠中 ポウフウ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g	内用薬	回復
漢方製剤	60歳代	女	肝障害	3包(6g)中葛根湯乾燥エキス4g(カッコン6.4g, マオウ・タイソウ各3.2g, ケイヒ・シャクヤク各2.4g, カンゾウ1.6g, ショウキョウ0.8g)	内用薬	不明
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	20歳代	女	ネフローゼ症候群		内用薬	回復
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	50歳代	女	血小板減少症		内用薬	回復
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	70歳代	男	薬疹	1包(20g)中マオウ3g, キョウニン・カンゾウ各2g, ヨクイニン5g, カンボウイ8g	内用薬	回復
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	30歳代	女	急性肝炎	100mL中生薬抽出液(トウキ69g, オウギ・ジオウ・ブクリョウ・シャクヤク・トウジン・アキョウ各4.5g, センキュウ・カンゾ	内用薬	回復

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	60歳代	男	間質性肺疾患	3包(4.5g)中痛散湯水製乾燥エキス0.5g(マオウ0.7g, キョウニン・カンゾウ各0.5g, ヨクイニン1.3g, ポウイ2g, 動物胆0.1g), マオウ0.6g, ヨクイニン末1.4g, カンゾウ末0.4g, ポウイ末1.6g	内用薬	回復
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	新生児	不明	口蓋裂・先天性足奇形・発育遅延	1個中ニコチン2mg	不明	不明